

USTED ES DIGNO DE MÁS

La *primera* tableta que se toma una vez al día y que ha demostrado ayudar a adultos con dermatomiositis

LISRAYA™
(brepocitinib)

LISRAYA es un tratamiento aprobado por la FDA que bloquea señales inflamatorias específicas que impulsan la dermatomiositis, para que usted pueda:

- ✓ **AUMENTAR SU FUERZA MUSCULAR**
- ✓ **DEPENDER MENOS DE LOS ESTEROIDES**
- ✓ **MEJORAR LOS SÍNTOMAS CUTÁNEOS**
- ✓ **HACER MÁS DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE AMA**

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA: INFECCIONES GRAVES, MORTALIDAD, NEOPLASIAS MALIGNAS, EVENTOS CARDIOVASCULARES ADVERSOS MAYORES (MAJOR ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENT, MACE) y TROMBOSIS

Uso

LISRAYA (brepocitinib) se utiliza para el tratamiento de adultos con dermatomiositis (DM).

Limitaciones de uso

LISRAYA no debe usarse en combinación con otros inhibidores de la JAK, otros inhibidores de TYK2, ni fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD) biológicos.

Consulte la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, y la Guía del medicamento.

Hablemos de la primera tableta que se toma una vez al día para adultos con dermatomiositis

Vivir con dermatomiositis (DM) es un desafío cotidiano. No se trata únicamente de la erupción cutánea y la debilidad muscular. También se trata de las dificultades a la hora de realizar las actividades cotidianas, la dependencia de dosis elevadas de esteroides y la preocupación constante por un posible brote.

Como la primera y única tableta aprobada por la FDA que se toma una vez al día para la DM, LISRAYA puede ayudar a:

- Aumentar la fuerza muscular para que pueda realizar más actividades cotidianas
- Mejorar los síntomas cutáneos
- Reducir significativamente su necesidad de esteroides

Hable con su médico sobre LISRAYA, el tratamiento para la DM que quizá esté buscando.



"Con LISRAYA, pude recuperar mi sentido de independencia y reintegrarme a mi estilo de vida habitual y a mis actividades de la vida cotidiana".

- Candice, una paciente tratada con LISRAYA

Información importante de seguridad (continúa)

LISRAYA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:


Infecciones graves. LISRAYA puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves durante el tratamiento con LISRAYA, incluida la tuberculosis (TB) activa, así como infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por todo el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones. Su proveedor de atención médica (healthcare provider, HCP) debe hacerle una prueba de TB antes de que comience a tomar LISRAYA y vigilar de cerca si



LISRAYA actúa sobre las causas fundamentales de la dermatomiositis

En la DM, ciertas partes del sistema inmunitario de su cuerpo se quedan atascadas en la posición de "activado". Se vuelven hiperactivas, lo que provoca una inflamación no deseada que ataca las células de la piel y las células musculares, causando síntomas comunes de la DM.

LISRAYA actúa de manera diferente a otros tratamientos para la DM. Desactiva interruptores inflamatorios específicos que están atascados en la posición de "activado", en lugar de suprimir el sistema inmunitario en general.



1x **LISRAYA es una tableta que puede tomar una vez al día donde prefiera.**

Información importante de seguridad (continúa)

presenta signos y síntomas de TB durante el tratamiento con LISRAYA. No deberá empezar a tomar LISRAYA si tiene algún tipo de infección, a menos que su HCP le indique que puede hacerlo. Si contrae una infección grave, es posible que su HCP suspenda su tratamiento hasta que la infección esté controlada. Puede tener un mayor riesgo de desarrollar culebrilla (herpes zóster).

LISRAYA™
(brepocitinib)

Se ha demostrado que ayuda a mejorar la dermatomiositis

LISRAYA se estudió en VALOR, el estudio clínico más grande jamás realizado en adultos con dermatomiositis. El estudio comparó a los pacientes que tomaron LISRAYA con los que tomaron placebo (una tableta que no contiene medicamento) durante un año completo.

Los pacientes que participaron en el estudio VALOR eran similares a las personas con DM en el mundo real: tenían una variedad de síntomas y habían probado diversos medicamentos para tratar su enfermedad.

En general, los pacientes que tomaron LISRAYA experimentaron mejoras (entre ellas, en los síntomas cutáneos, la fuerza muscular y la función diaria) ***ya a las cuatro semanas de iniciar el tratamiento,*** y siguieron mejorando hasta el final del estudio de 52 semanas.



"Con LISRAYA, pasé de ser alguien que apenas podía levantarse del sofá a volver a trabajar y socializar, a poder hacer cosas de nuevo".

- Tamara, una paciente tratada con LISRAYA

Información importante de seguridad (continúa)

Mayor riesgo de muerte en personas de 50 años o más que tienen al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca y toman un medicamento perteneciente a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la Janus cinasa (JAK). LISRAYA es un medicamento inhibidor de la JAK.

Cáncer y problemas del sistema inmunitario. LISRAYA puede aumentar su riesgo de algunos tipos de cáncer. Pueden aparecer linfoma y otros tipos de cáncer, incluido cáncer de piel. Las personas que fuman actualmente o que fumaron en el pasado tienen un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, entre ellos el linfoma y el cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones de su HCP para realizarse

LISRAYA impulsó una mejora global significativa

Para tener un panorama completo de cómo estaban los pacientes del estudio VALOR, los médicos midieron su progreso usando el **puntaje de mejora total (Total Improvement Score, TIS)**, que combina varios puntajes para la fuerza muscular, los síntomas cutáneos y la función diaria en un solo puntaje. Un TIS más alto significa una mayor mejora global.



Imagine que el TIS es una "libreta de calificaciones" que ayuda a medir las mejoras en varios aspectos de la DM.

Los pacientes que tomaron LISRAYA mostraron una mejora significativamente mayor en el TIS que los pacientes que tomaron placebo (TIS promedio de 47.5 vs. 33.3). Esto significa que los pacientes tenían más fuerza, se sentían menos enfermos y podían realizar mejor las tareas cotidianas, como vestirse y hacer diligencias.

MEJORA MODERADA O SIGNIFICATIVA DESPUÉS DE UN AÑO



69%
de pacientes que tomaron LISRAYA
vs. 47% que tomaron placebo

MEJORA EN LA ACTIVIDAD GENERAL DE LA ENFERMEDAD INFORMADA POR LOS PACIENTES



Los números representan la mejora en la PtGA, que se califica en una escala de 0 a 10.

- Después de un año, según el TIS, **más de dos tercios de los pacientes tratados con LISRAYA mostraron una mejora moderada o significativa en sus síntomas generales de DM.**
- Cuando se les pidió que calificaran la actividad general de su enfermedad en un puntaje de Evaluación global del paciente (Patient Global Assessment, PtGA), **los pacientes que recibieron LISRAYA informaron una mejora más de cuatro veces mayor** que los pacientes que recibieron placebo.

Información importante de seguridad (continúa)

controles de la piel en busca de cáncer de piel durante el tratamiento con LISRAYA. Limite la cantidad de tiempo que pasa al sol. Use ropa protectora cuando esté al sol y use protector solar.

Mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte, en personas de 50 años o más que

LISRAYA™ (brepocitinib)


LISRAYA ayuda a los pacientes con dermatomiositis a recuperar la fuerza para la vida diaria y a mejorar los síntomas cutáneos

Mejoras en los músculos y la función física

LISRAYA ayudó a los pacientes con DM a recuperar la fuerza para la vida diaria. Los pacientes que tomaron LISRAYA informaron que experimentaron menos dolor y fatiga, y que les resultaba más fácil realizar actividades cotidianas, tales como:

- Vestirse
- Comer
- Lavarse el cabello
- Hacer diligencias
- Alcanzar objetos

Estas mejoras se midieron mediante un cuestionario llamado HAQ-DI,* en el que los pacientes calificaron su dolor y qué tan difícil les resultaba realizar una variedad de actividades cotidianas.



- A lo largo del estudio, **los pacientes que tomaron LISRAYA experimentaron una mejora significativa** en sus puntajes del HAQ-DI, mientras que los pacientes que tomaron placebo empeoraron.
- Más del 40% de los pacientes que tomaron LISRAYA **mejoraron tanto que incluso alcanzaron la "remisión funcional"**, un puntaje del HAQ-DI tan bajo que presentaban un funcionamiento como si no tuvieran la enfermedad.†

* Índice de discapacidad del Cuestionario de Evaluación de la Salud.
† El 44% de los pacientes tratados con LISRAYA lograron la remisión funcional según el HAQ-DI (HAQ-DI <0.5), en comparación con el 20% de los pacientes que recibieron placebo. Este fue un "análisis post hoc", lo que significa que se necesitaría trabajo adicional para confirmar el resultado.

Información importante de seguridad (continúa)

tienen al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) y toman un inhibidor de la JAK, especialmente si fuma actualmente o fumó en el pasado.

Coágulos de sangre. En algunas personas que toman LISRAYA, pueden formarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o en los pulmones, así como en las arterias. Esto puede poner en peligro la vida y provocar la muerte. Se han formado coágulos de sangre en las venas de las piernas y en los pulmones con mayor frecuencia en personas de 50 años o más que tienen al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) y toman un inhibidor de la JAK.



"Con LISRAYA, pude vestirme por mi cuenta, jugar con mis nietos y entrar y salir de los vehículos".


- Glennis, una paciente tratada con LISRAYA

Mejoras en los síntomas cutáneos

Además de ganar fuerza y mejorar su capacidad para realizar actividades cotidianas, los pacientes que recibieron LISRAYA en el estudio VALOR experimentaron una mejora significativa en la actividad de su enfermedad cutánea.*

Fotos de pacientes reales

Antes de tomar LISRAYA



Después de un año



Muchos pacientes que tomaron LISRAYA pasaron de tener una actividad significativa de la enfermedad cutánea a tener prácticamente ninguna actividad.†

* Los pacientes que tomaron LISRAYA observaron una mejora de 12.2 puntos en el CDASI-A, un puntaje que los médicos usan para medir la actividad y el daño de la enfermedad cutánea en la DM, en comparación con 8.0 puntos en los que tomaron placebo.

† Al final del estudio VALOR, el 46% de los pacientes que tenían enfermedad cutánea de moderada a grave (un puntaje de 3+ en la CDA-IGA, un puntaje que los médicos usan para medir la enfermedad cutánea) al inicio del estudio lograron una piel sin lesiones o casi sin lesiones (un puntaje de 0 o 1 en la CDA-IGA) con LISRAYA, en comparación con el 22% de los pacientes que recibieron placebo. Este fue un "análisis post hoc", lo que significa que se necesitaría trabajo adicional para confirmar el resultado.

Información importante de seguridad (continúa)

Reacciones alérgicas. En personas que toman LISRAYA, se han observado síntomas como erupción (urticaria), dificultad para respirar, sensación de desmayo o mareo, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que pueden indicar que están teniendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta alguno de estos síntomas durante el tratamiento con LISRAYA, deje de tomar LISRAYA y busque atención médica de emergencia de inmediato.

LISRAYA™ (brepocitinib)

LISRAYA reduce significativamente la dependencia de los esteroides

LISRAYA ayudó a los pacientes con DM a reducir su dependencia de los esteroides y, aun así, mejorar la actividad de la enfermedad.* En el estudio VALOR, más del 60% de los pacientes tratados con LISRAYA que al inicio del ensayo tomaban al menos dosis moderadas de esteroides pudieron dejar de tomarlos por completo o reducir la dosis a una cantidad diaria muy baja.

REDUCCIÓN DE ESTEROIDES CON LISRAYA



Más del 60% de los pacientes pudieron dejar de tomar esteroides por completo o reducir la dosis a una cantidad diaria muy baja.†

†Entre los pacientes que tomaban una dosis mayor o igual a 7.5 mg/día de corticosteroides al inicio, el 62% pudo alcanzar una dosis de corticosteroides menor o igual a 2.5 mg/día en las semanas 48-52, en comparación con el 38% de los pacientes tratados con placebo.

Hable con su médico sobre la posibilidad de reducir su uso de esteroides con LISRAYA.



"Con LISRAYA, pude dejar de tomar prednisona por completo".

- Veronica, una paciente tratada con LISRAYA

* Entre los pacientes tratados con LISRAYA, el 55% logró una mejora moderada o superior (TIS ≥40) y un uso mínimo a nulo de esteroides (2.5 mg/día o menos), en comparación con el 30% de quienes recibieron placebo.

Información importante de seguridad (continúa)

Desgarros en el estómago o los intestinos. Algunas personas que toman LISRAYA pueden sufrir desgarros en el estómago o los intestinos. Esto ocurre con mayor frecuencia en personas que toman medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticosteroides. Busque atención médica de inmediato si presenta dolor en la zona del estómago, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.

Niveles bajos de azúcar en sangre en personas con diabetes. Si tiene diabetes, es posible que su proveedor de atención médica le indique que controle su nivel de azúcar en sangre (glucosa) con más frecuencia durante el tratamiento con LISRAYA. Llame a su proveedor de atención médica si tiene



¿Qué debo saber sobre los efectos secundarios de LISRAYA?

Al considerar un tratamiento, hable con su médico sobre los posibles beneficios y efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes observados con LISRAYA en el estudio VALOR fueron:

Efecto secundario (de cualquier gravedad)	**LISRAYA 30 mg** (n=81)
Infección de las vías respiratorias superiores	15%
Dolor de cabeza	15%
Fatiga	12%
Infección de las vías urinarias	11%
Náuseas	11%
Bronquitis	10%
Artralgia	10%
Diarrea	9%
Dolor de espalda	9%
Caída	7%
Influenza	6%
Acné	6%

- La mayoría de los pacientes del estudio VALOR pudieron continuar con el tratamiento, a pesar de los efectos secundarios que pudieran tener. Menos pacientes dejaron de tomar LISRAYA debido a los efectos secundarios en comparación con los pacientes que tomaron placebo (6% vs. 11%).

Consulte la Información importante de seguridad completa, incluido el Recuadro de advertencias, para obtener más detalles.

Información importante de seguridad (continúa)

algún problema con niveles bajos de azúcar en sangre.

Cambios en los resultados de ciertas pruebas de laboratorio. Su HCP debe hacerle análisis de sangre antes de que empiece a tomar LISRAYA y mientras lo esté tomando. Es posible que su HCP interrumpa su tratamiento con LISRAYA durante un tiempo, si es necesario, debido a cambios en los resultados de estos análisis de sangre.

LISRAYA™ (brepocitinib)

Su aliado en el proceso de tratamiento:
My Compass Support



Transitar el tratamiento de una enfermedad rara puede generar incertidumbre, pero no tiene que recorrerlo a solas. Al inscribirse en My Compass Support para LISRAYA, recibirá un **enlace de acceso para pacientes (PAL)** exclusivo para recibir apoyo personalizado en cada paso del camino.

my compass support

Servicios principales de apoyo

Comunicación personalizada
Su PAL está disponible de la manera que prefiera: por mensaje de texto, llamada telefónica, correo electrónico o en persona.

Asistencia con los costos
Su PAL le explicará su cobertura de seguro y cualquier gasto de bolsillo.

Si es elegible, pueden ayudarle a inscribirse en el Programa de Ahorros en Copagos de My Compass Support, donde **podría pagar tan solo $0* al mes por LISRAYA.**

Si tiene Medicare o Medicaid, también pueden ayudarle a identificar organizaciones que podrían brindarle asistencia con los costos.

Apoyo con la autorización
Muchos planes de seguro requieren autorización para el tratamiento. Su PAL se comunicará con el consultorio de su médico para acompañar este proceso y mantenerle al tanto.

Coordinación con la farmacia especializada
Su PAL coordinará con la farmacia especializada que le envía LISRAYA directamente a su hogar todos los meses.

Apoyo personal y comunidad
Su PAL se comunicará periódicamente con usted para ayudarle a alcanzar sus objetivos de salud.

* El Programa de Ahorros en Copagos de My Compass Support está disponible únicamente para pacientes elegibles con seguro privado o proporcionado por su empleador y está sujeto a los términos y condiciones que se encuentran en MyCompassSupport.com/es-us/terminos-condiciones.

Información importante de seguridad (continúa)

Antes de tomar LISRAYA, informe a su HCP si usted:

- tiene una infección.
- fuma actualmente o fumó en el pasado.
- ha tenido algún tipo de cáncer.
- ha tenido un ataque cardíaco u otros problemas cardíacos, o un accidente cerebrovascular.
- tiene problemas en el hígado o los riñones.
- tiene dolor de estómago (abdominal) sin causa aparente, tiene antecedentes de diverticulitis o úlceras en el estómago o los intestinos, o está tomando AINE.

Inscribirse en My Compass Support es sencillo

Solo envíe un mensaje de texto con la palabra **LISRAYA** al **37538**. También puede escanear el código para inscribirse en MyCompassSupport.com/es-us/.

Después de inscribirse, su PAL se comunicará con usted para darle la bienvenida.

Guía de conversación

Comenzar un nuevo tratamiento es una decisión importante que usted toma en colaboración con su médico. Aquí tiene una lista útil de preguntas para hacer en su próxima cita:

- ¿Es LISRAYA una posible opción de tratamiento para mi dermatomiositis?
- ¿Podría LISRAYA ayudarme a mejorar mis síntomas musculares y mi función física?
- ¿Podría LISRAYA ayudarme a mejorar mi erupción cutánea y mis síntomas de picazón?
- ¿Podría LISRAYA ayudarme a reducir el uso de esteroides?
- Si estoy conforme con los medicamentos que tomo actualmente para la DM, ¿puedo seguir tomándolos junto con LISRAYA?
- ¿Qué debo saber sobre los posibles riesgos de LISRAYA?

Información importante de seguridad (continúa)

- tiene diabetes.
- tiene recuentos bajos de glóbulos rojos o blancos.
- ha recibido recientemente o tiene programado recibir una inmunización (vacuna). Las personas que toman LISRAYA no deben recibir vacunas con virus vivos.

LISRAYA™ (brepocitinib)

Información importante de seguridad e Indicación y uso

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA: INFECCIONES GRAVES, MORTALIDAD, NEOPLASIAS MALIGNAS, EVENTOS CARDIOVASCULARES ADVERSOS MAYORES (MAJOR ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENT, MACE) y TROMBOSIS

Uso

LISRAYA (brepocitinib) se utiliza para el tratamiento de adultos con dermatomiositis (DM).

Limitaciones de uso

LISRAYA no debe usarse en combinación con otros inhibidores de la JAK, otros inhibidores de TYK2, ni fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD) biológicos.

LISRAYA puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Infecciones graves. LISRAYA puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Se han producido infecciones graves durante el tratamiento con LISRAYA, incluida la tuberculosis (TB) activa, así como infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por todo el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones. Su proveedor de atención médica (healthcare provider, HCP) debe hacerle una prueba de TB antes de que comience a tomar LISRAYA y vigilar de cerca si presenta signos y síntomas de TB durante el tratamiento con LISRAYA. No deberá empezar a tomar LISRAYA si tiene algún tipo de infección, a menos que su HCP le indique que puede hacerlo. Si contrae una infección grave, es posible que su HCP suspenda su tratamiento hasta que la infección esté controlada. Puede tener un mayor riesgo de desarrollar culebrilla (herpes zóster).

Mayor riesgo de muerte en personas de 50 años o más que tienen al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca y toman un medicamento perteneciente a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la Janus cinasa (JAK). LISRAYA es un medicamento inhibidor de la JAK.

Cáncer y problemas del sistema inmunitario. LISRAYA puede aumentar su riesgo de algunos tipos de cáncer. Pueden aparecer linfoma y otros tipos de cáncer, incluido cáncer de piel. Las personas que fuman actualmente o que fumaron en el pasado tienen un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, entre ellos el linfoma y el cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones de su HCP para realizarse controles de la piel en busca de cáncer de piel durante el tratamiento con LISRAYA. Limite la cantidad de tiempo que pasa al sol. Use ropa protectora cuando esté al sol y use protector solar.

Mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte, en personas de 50 años o más que tienen al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) y están tomando un inhibidor de la JAK, especialmente si fuma actualmente o fumó en el pasado.

Coágulos de sangre. En algunas personas que toman LISRAYA, pueden formarse coágulos de sangre en las venas de las piernas o en los pulmones, así como en las arterias. Esto puede poner en peligro la vida y provocar la muerte. Se han formado coágulos de sangre en las venas de las piernas y en los pulmones con mayor frecuencia en personas de 50 años o más que tienen al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) y toman un inhibidor de la JAK.

Reacciones alérgicas. En personas que toman LISRAYA, se han observado síntomas como erupción (urticaria), dificultad para respirar, sensación de desmayo o mareo, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que pueden indicar que están teniendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta alguno de estos síntomas durante el tratamiento con LISRAYA, deje de tomar LISRAYA y busque atención médica de emergencia de inmediato.

Desgarros en el estómago o los intestinos. Algunas personas que toman LISRAYA pueden sufrir desgarros en el estómago o los intestinos. Esto ocurre con mayor frecuencia en personas que toman medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticosteroides. Busque atención médica de inmediato si presenta dolor en la zona del estómago, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.

Información importante de seguridad (continúa)

Niveles bajos de azúcar en sangre en personas con diabetes. Si tiene diabetes, es posible que su proveedor de atención médica le indique que controle su nivel de azúcar en sangre (glucosa) con más frecuencia durante el tratamiento con LISRAYA. Llame a su proveedor de atención médica si tiene algún problema con niveles bajos de azúcar en sangre.

Cambios en los resultados de ciertas pruebas de laboratorio. Su HCP debe hacerle análisis de sangre antes de que empiece a tomar LISRAYA y mientras lo esté tomando. Es posible que su HCP interrumpa su tratamiento con LISRAYA durante un tiempo, si es necesario, debido a cambios en los resultados de estos análisis de sangre.

Antes de tomar LISRAYA, informe a su HCP si usted:

- tiene una infección.
- fuma actualmente o fumó en el pasado.
- ha tenido algún tipo de cáncer.
- ha tenido un ataque cardíaco u otros problemas cardíacos, o un accidente cerebrovascular.
- tiene problemas en el hígado o los riñones.
- tiene dolor de estómago (abdominal) sin causa aparente, tiene antecedentes de diverticulitis o úlceras en el estómago o los intestinos, o está tomando AINE.
- tiene diabetes.
- tiene recuentos bajos de glóbulos rojos o blancos.
- ha recibido recientemente o tiene programado recibir una inmunización (vacuna). Las personas que toman LISRAYA no deben recibir vacunas con virus vivos.
- está embarazada o planea quedar embarazada. LISRAYA puede causar daños a su bebé en gestación.
- está amamantando o planea amamantar. LISRAYA puede pasar a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LISRAYA ni durante los 3 días posteriores a su última dosis de LISRAYA.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica verificará si está embarazada antes de que comience el tratamiento con LISRAYA.
- Debe usar un método anticonceptivo eficaz para evitar quedar embarazada durante el tratamiento con LISRAYA y durante 3 días después de su última dosis de LISRAYA.
- Informe a su proveedor de atención médica si cree que está embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con LISRAYA.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. LISRAYA y otros medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios.

En especial, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos que afectan su sistema inmunitario, ya que estos medicamentos pueden aumentar su riesgo de infección. Consulte con su proveedor de atención médica o farmacéutico si no sabe con certeza si está tomando alguno de estos medicamentos.

Los efectos secundarios más comunes de LISRAYA incluyen:

- resfriado, infecciones de los senos paranasales o dolor de garganta (infecciones de las vías respiratorias superiores)
- dolor de cabeza
- cansancio o falta de energía (fatiga)
- infección de las vías urinarias
- náuseas
- acné
- diarrea
- caídas
- bronquitis
- gripe (influenza)
- dolor articular (artralgia)
- dolor de espalda

LISRAYA™ (brepocitinib)

Consulte la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIAS, y la Guía del medicamento.



Pregúntele a su médico sobre LISRAYA, una tableta aprobada por la FDA que se toma una vez al día para que usted pueda:

- ✓ AUMENTAR SU FUERZA MUSCULAR
- ✓ DEPENDER MENOS DE LOS ESTEROIDES
- ✓ MEJORAR LOS SÍNTOMAS CUTÁNEOS
- ✓ HACER MÁS DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE AMA

Consulte la Información importante de seguridad en este folleto y acceda a la Información de prescripción completa, incluido el Recuadro de advertencias, en LISRAYA.com/es-us/informacion-de-prescripcion/

Escanee el código para visitar LISRAYA.com/es-us/

priovant therapeutics

©2026 Priovant Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. LISRAYA es una marca comercial de Priovant Therapeutics, Inc. LIS-001 08/26